

BOTOX- nadpotliwość

BOTOX jest zalecany w przypadku miejscowej nadmiernej potliwości przede wszystkim w rejonie pach. Stosujemy go w przypadku niepowodzenia innych terapii. Po wstrzyknięciu do skóry określonej, niewielkiej dawki BOTOX blokuje działanie nerwów, które oplatają gruczoły potowe. To zapobiega wydzielaniu potu. Blokada utrzymuje się przez kilka- kilkanaście miesięcy, zanika stopniowo, choć u części pacjentów potliwość nie wraca już do poziomu sprzed terapii!

Zabieg trwa zwykle około pół godziny. Znieczulenie najczęściej nie jest potrzebne (wymagane tylko przy terapii nadpotliwości dłoni). Lekarz przy użyciu bardzo cienkiej igły wstrzykuje niewielkie objętości (0.1-0.2 mililitra) roztworu BOTOX-u w 10-15 miejsc, oddalonych od siebie o 1 cm, pokrywając równomiernie okolicę obu pach. Zabieg jest najczęściej poprzedzany specjalnym testem, umożliwiającym określenie miejsc o wzmożonej potliwości. Po zabiegu możemy wrócić do normalnej aktywności, rzadko obserwuje się przejściowe osłabienie siły ramion.

Przeciwwskazania do terapii lekiem BOTOX- patrz leczenie zmarszczek mimicznych.